



ثانوية : 18 فيفري - الحمادية .
 ثانوية : بلعروسي بن يحيى - الرابطة .
 دورة : ماي 2019
 المدة : 04 سا و 30 د

مديرية التربية لولاية البرج
 امتحان تجريبي لبكالوريا التعليم الثانوي
 الشعبة : 3 رياضيات + تقني رياضي
 اختبار في مادة : الرياضيات

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين الآتيين :

الموضوع الأول

التمرين الأول : (04 نقاط)

- (I) أدرس حسب قيم العدد الطبيعي n بوافي القسمة الاقليدية للعدد 3^n على 10 .
 (2) استنتج باقي قسمة العدد A على 10 حيث : $A = 2019^{2018} - 2017^{1440}$.
 (3) برهن أنه من أجل كل عدد طبيعي n فإن : $3n \times 1439^n + 1037^{2n+1} \equiv (n-1)3^{2n+1} [10]$.
 (4) استنتاج قيم العدد الطبيعي n حتى يكون : $3n \times 1439^n + 1037^{2n+1} \equiv 0 [10]$.
 (1) أحسب : $\text{PGCD}(225; 180)$ (II)
 (2) حل في \mathbb{Z}^2 المعادلة : $225x - 180y = 90$.
 (3) نعتبر العددين الطبيعيين a و b حيث : $b = \overline{252}^\alpha = \overline{206}^\beta$ ، $a = \overline{52}^\alpha = \overline{44}^\beta$. عين α ، β ثم a و b .

التمرين الثاني : (05 نقاط)

- (1) نعتبر في مجموعة الأعداد المركبة \mathbb{C} المعادلة ذات المجهول z :

$$(E) \dots \bar{z}^3 - 3\bar{z}^2 + 3\bar{z} + 7 = 0$$
 أ) بين أن المعادلة (E) تكافئ المعادلة : $(\bar{z}+1)(\bar{z}^2 - 4\bar{z} + 7) = 0$.
 ب) حل في \mathbb{C} المعادلة (E) .
 (2) في المستوى المنسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{u}; \vec{v})$ ، نعتبر النقط A ، B ، C و D لواحقها على الترتيب : $z_D = 3$ ، $z_C = \bar{z}_B$ ، $z_B = 2+i\sqrt{3}$ ، $z_A = -1$. عين قيم العدد الطبيعي n حتى يكون $(z_A - z_B)^n$ عددا حقيقيا سالبا .
 ب) عين طبيعة المثلث ABC .
 (3) أكتب العدد $\frac{z_A - z_C}{z_D - z_C}$ على الشكل الأسني ، ثم استنتاج أن النقطة A صورة D بتحويل نقطي يطلب تعبينه .
 ب) أوجد مركز ونصف قطر الدائرة المحيطة بالمثلث ACD .
 (4) (Г) مجموعة النقط M من المستوى لاحقتها z تحقق : $z + 1 = 2\sqrt{3} \cdot k e^{i\frac{\pi}{6}}$ حيث k يمسح المجال $[0; +\infty)$. عين قيسا للزاوية الموجهة $(\vec{u}; \vec{AB})$ ، ثم استنتاج مجموعة النقط (Г) .
 (5) أ) عين قيمة العدد الحقيقي α بحيث يكون : $-\overrightarrow{CA} + 2\overrightarrow{CB} + \alpha\overrightarrow{CD} = \vec{0}$.
 ب) عين (E) مجموعة النقط M من المستوى حيث : $\|-\overrightarrow{AM} + 2\overrightarrow{BM} - 3\overrightarrow{DM}\| \leq 2\|\overrightarrow{BM} - \overrightarrow{CM}\|$.
 ج) استنتاج مجموعة نقط تقاطع (E) و (Г) .

التمرين الثالث : (40 نقاط)

كيس يحتوي على 5 كرات حمراء و 3 كرات بيضاء ، كل الكرات متماثلة و لا نفرق بينها عند اللمس

1) نسحب من الكيس 3 كرات عشوائيا و في آن واحد .

- أحسب احتمال كل حادثة من الحوادث التالية :

A : " الكرات المسحوبة كلها حمراء " .

C : " توجد على الأقل كرة واحدة بيضاء في السحب " . D : " الكرات المسحوبة من ألوان مختلفة " .

2) تنزع من الكيس الكرات البيضاء و نضع مكانها n كرة سوداء حيث : ($n \geq 2$) ثم نسحب كرتين على التوالي دون إرجاع

- نفرض أن سحب كرة حمراء يساوي (-10) نقطة ، و سحب كرة سوداء يساوي (+5) نقطة .

ليكن X المتغير العشوائي الذي يرفق كل سحب كرتين مجموع النقط المحصل عليها .

أ) أكتب قانون احتمال المتغير العشوائي X ، ثم أحسب الأمل الرياضي و الانحراف المعياري .

ب) عين قيمة n حتى تكون اللعبة مربحة .

التمرين الرابع : (40 نقاط)

I) لتكن الدالة العددية f المعرفة على \mathbb{R} كما يلي :

ولتكن (C_f) تمثيلها البياني في المستوى المنسوب إلى معلم متعمد ومتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$ مع $\|\vec{i}\| = 2\text{cm}$

1) تحقق أنه من أجل كل x من \mathbb{R} فإن :

ب) أثبت أن الدالة f فردية ، ثم أحسب النهايتين : $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

2) أبين أنه من أجل كل عدد حقيقي x فإن :

ب) استنتاج اتجاه تغير الدالة f ، ثم شكل جدول تغيراتها .

ج) استنتاج أنه من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $[0; +\infty)$ فإن :

أ) أحسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left[f(x) - 1 + \frac{1}{2}x \right]$ ، ثم فسر النتيجة هندسيا .

ب) استنتاج أن المنحنى (C_f) يقبل مستقيما مقاربا مائلا (Δ) عند ∞ – يطلب تعين معادلته .

4) أرسم المستقيم (d) ذو المعادلة $x = 1 - \frac{1}{2}y$ و المستقيم (Δ) ، ثم أنشئ المنحنى (C_f) .

5) ليكن λ عددا حقيقيا موجبا تماما

أ) أبين أنه من أجل كل عدد حقيقي x يكون :

ب) أحسب بالـ cm^2 مساحة الحيز المستوى $A(\lambda)$ المحدد بالمنحنى (C_f) والمستقيم (d) والمستقيمين ذو المعادلتين :

$x = \lambda$ و $x = 0$ ، ثم أحسب $A(\lambda)$ لما λ يؤول إلى $+\infty$.

II) نعتبر المتالية العددية (u_n) المعرفة بحدها الأول $u_0 = 1$ ومن أجل كل عدد طبيعي n :

1) أثبت بالترابع أنه من أجل كل عدد طبيعي n فإن :

2) تتحقق أنه من أجل كل عدد طبيعي n :

ب) استنتاج أن المتالية (u_n) متناقصة . ماذا يمكن القول عن تقاربها ؟

3) أبين أنه من أجل $n \in \mathbb{N}$ فإن :

الموضوع الثاني

التمرين الأول : (05 نقاط)

($\alpha \geq 2$) عدد حقيقي α المعرفة على N^* كما يلي :

$$\begin{cases} u_1 = \frac{1}{\alpha} \\ u_{n+1} = \frac{n+1}{\alpha n} u_n \end{cases} : n \in N^*$$

- (1) برهن بالترابع أنّ من أجل كل عدد طبيعي n من N^* . $u_n > 0$.
 (2) أ- برهن ان من أجل كل عدد طبيعي n من N^* . $n+1 - \alpha n \leq 0$
 ب- استنتج ان المتالية u_n متناقصة. هل u_n متقاربة. عل.

(3) لتكن v_n المتالية المعرفة على N^* كما يلي :

$$v_n = \frac{1}{\alpha^{n+1}} : n \in N^*$$

أ- برهن أن من أجل كل طبيعي n من N^* .

ب- أكتب u_n بدلالة n و α ثم برهن ان :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (u_n) = 0$$

(4) نعتبر المتالية s_n المعرفة على N^* كما يلي :

$$s_n = u_1 + \frac{1}{2}u_2 + \frac{1}{3}u_3 + \dots + \frac{1}{n}u_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}u_k$$

أ- أكتب s_n بدلالة n و α .

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (s_n) = \frac{1}{2018}$$

التمرين الثاني : (04 نقاط)

في معلم متعمد و متجانس ($O; \vec{i}; \vec{j}; \vec{k}$) من الفضاء ، نعتبر النقط

و لتكن (s) مجموعة النقط ($M(x; y; z)$ حيث : $x^2 + y^2 + z^2 + 2x - 4z = 0$)

(1) برهن ان (s) سطح كرة يطلب تعين مركزها ونصف قطرها.

(2) ليكن (P) المستوي الذي يعمد (AB) ويشمل النقطة

أ- برهن ان معادلة المستوي (P) هي : $2y - 3z = 0$.

ب-برهن ان (P) يمس (s) في نقطة H يطلب تعين احداثياتها.

(3) ليكن (Q) المستوي الذي يمس (s) في النقطة B

أ- برهن ان معادلة المستوي (Q) من الشكل : $-2x + z + 1 = 0$.

ب-برهن ان (P) و (Q) يتقاطعان وفق مستقيم (Δ) يطلب اعطاء تمثيل وسيطي له.

(4) ليكن (Q_m) مستوي حيث : $-2x + z + m = 0$

أ- عين حسب قيم m طبيعة المجموعة ($(s) \cap (Q_m)$) .

ب-برهن ان (Q_0) يقطع (s) وفق دائرة يطلب تحديد مركزها ونصف قطرها.

التمرين الثالث : (40 نقاط)

$$z_2 = \frac{\sqrt{2} + (-1 + \sqrt{2})i}{1 - z_1} \quad z_1 = \sqrt{2}(1 - i) \quad \text{و} \quad z_2 = \sqrt{2}(1 - i)^2 \quad \text{حيث : } (1)$$

أ - أكتب العدد z على الشكل المثلثي و الشكل الأسني و z على الشكل الجيري.

(2) في المستوى المنسوب إلى معلم متعمد ومتجانس مباشر ، M و $'M$ نقطتان لاحقا هما z و $'z$ على الترتيب ؛ نضع $M = x + iy$ و $'M = x' + iy$. نعتبر التحويل النقطي S الذي يرافق بكل نقطة M ، النقطة $'M$

$$\begin{aligned} & \cdot \begin{cases} x' = \sqrt{2}(x + y + 1) \\ y' = \sqrt{2}(-x + y + 1) - 1 \end{cases} \\ & \text{حيث : } \end{aligned}$$

أ - بين أن العبارة المركبة للتحويل S هي من الشكل: $z' = \sqrt{2}(1 - i)z + \sqrt{2} + i\sqrt{2} - i$.

ب - استنتج الطبيعة والعناصر المميزة للتحويل S .

ج - Δ المستقيم ذو المعادلة $x + y + 1 = 0$ ، أكتب معادلة لصورة المستقيم Δ بالتحويل S

(3) أ - أكتب العبارة المركبة للتحويل $S \circ S$. واستنتاج طبيعته وعناصره المميزة.

ب - قارن بين العناصر المميزة للتحوبلين S و $S \circ S$.

التمرين الرابع : (40 نقاط)

$$g(x) = x^2 + 2x - \ln(x + 1)^2 \quad \text{كما يلي: } \quad (I)$$

(1) أدرس تغيرات الدالة g واستنتاج إشارة $g(x)$.

$$f(x) = \frac{x^2 + x + 2 \ln|x+1|}{x+1} \quad \text{حيث: } \quad (II)$$

(c_f) تمثيلها البياني في معلم متعمد ومتجانس $(\vec{o}; \vec{i}; \vec{j})$.

$$f(x) = ax + \frac{b \ln|x+1|}{x+1} : x \neq -1 \quad \text{حيث يكون من أجل كل } x \neq -1 \quad (a, b \text{ عين العددين الحقيقيين})$$

$$f'(x) = \frac{g(x)+3}{(x+1)^2} : x \neq -1 \quad (b)$$

ت-أدرس تغيرات الدالة f .

ث-بين أن (c_f) يقبل مستقيما مقاربا مائلا (D) يتطلب تعبينه. ثم أدرس وضعية (c_f) بالنسبة إلى (D) .

أ-برهن على وجود مماسين (T') ; (T) لـ (c_f) يوازيان (D) اكتب معادلتيهما. (III)

ب-برهن أن النقطة $(-1; -1)$ مركز تناظر للمنحنى (c_f) .

ت-أنشئ: (D) , (T') , (T) , (c_f) (الوحدة 2cm).

ث-أحسب مساحة الحيز المستوى المحدد بالمنحنى (c_f) والمستقيمات : $x = -\frac{2}{3}$; $x = 2$; $y = x$.

ج- نقش حسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد نقاط تقاطع المنحنى (c_f) والمستقيمات (D_m) التي معادلاتها $y = x + m$