

التحضير لبكالوريا 2019

شعبة: تسيير و اقتصاد

3

سلسلة الدوال الأصلية والتكاملات

التمرين 1:

f و F دالتان معرفتان على $\left[\frac{1}{2}; +\infty\right[$ بـ

$$F(x) = \frac{2x+1}{2x-1} + 4x \quad \text{و} \quad f(x) = \frac{16(x^2-1)}{(2x-1)^2}$$

بين أن الدالة F أصلية للدالة f على $\left[\frac{1}{2}; +\infty\right[$.

التمرين 2:

G و F دالتان معرفتان على $[0; +\infty[$ بـ:

$$G(x) = \frac{5}{(x+1)^2} - 1 \quad \text{و} \quad F(x) = \frac{x^2+2x-4}{(x+1)^2}$$

تحقق أن الدالتين F و G أصليتان لنفس الدالة

(1) جبريا (2) باستعمال المشتقة

التمرين 3:

بين أن الدالة F أصلية للدالة f على المجال D في كل حالة من الحالات التالية:

$$(1) D = \mathbb{R}, \quad f: x \mapsto 2x-3, \quad F: x \mapsto x^2-3x+1.$$

$$(2) f: x \mapsto 3x^2-12x+9, \quad F: x \mapsto x^3-6x^2+9x.$$

$$D = \mathbb{R}$$

$$(3) f: x \mapsto \frac{-2}{(x-1)^2}, \quad F: x \mapsto 2 + \frac{x+1}{x-1}.$$

$$D =]1; +\infty[$$

$$(4) f: x \mapsto \frac{-x^2-2x-1}{(x^2-1)^2}, \quad F: x \mapsto \frac{x+1}{x^2-1}.$$

$$D =]1; +\infty[$$

$$(5) f: x \mapsto 1 + \frac{3}{x^2}, \quad F: x \mapsto \frac{x^2+2x-3}{x}.$$

$$D =]0; +\infty[$$

التمرين 4:

f دالة معرفة على $\mathbb{R}$ بـ:

$$f(x) = 2x + \frac{1}{2}$$

1. أعط دالة أصلية للدالة f على $\mathbb{R}$.

2. أعط كل الدوال الأصلية للدالة f على $\mathbb{R}$.

3. جد الدالة الأصلية F للدالة f والتي تحقق: $F(1) = 2$.

التمرين 3:

f و F دالتان معرفتان على $\left[\frac{1}{2}; +\infty\right[$ بـ

$$F(x) = \frac{ax^2+bx+c}{1-x} \quad \text{و} \quad f(x) = \frac{-x^2+2x+2}{(1-x)^2}$$

عين الأعداد الحقيقية a , b , و c حتى تكون الدالة F

أصلية للدالة f على $\left[\frac{1}{2}; +\infty\right[$ حيث $F(0) = 3$.

التمرين 5:

f و F دالتان معرفتان على $\left[\frac{1}{2}; +\infty\right[$ بـ

$$F(x) = \frac{2x+1}{1-x} \quad \text{و} \quad f(x) = \frac{3}{(1-x)^2}$$

1. بين أن الدالة F أصلية للدالة f على $\left[\frac{1}{2}; +\infty\right[$.

2. استنتج الدالة الأصلية G للدالة f التي تأخذ القيمة

$\frac{1}{2}$ عند 3.

التمرين 6:

f دالة معرفة على $[0; +\infty[$ كما يلي:

$$f(x) = x + \frac{1}{2x^2} - \frac{3}{4x^3}$$

1. تحقق أن الدالة F المعرفة بـ:

$$F(x) = \frac{x^2}{2} - \frac{1}{2x} + \frac{3}{8x^2}$$

2. عين الدالة الأصلية G للدالة f و التي تتعدم من

اجل $\frac{11}{8}$.

التمرين 7:

نعتبر الدالتين F و G المعرفتين على $\left[\frac{1}{2}; +\infty\right[$ كما

يلي:


$$G(x) = \frac{2x-1}{x-2} + x \quad \text{و} \quad F(x) = \frac{x^2-2x+3}{x-2}$$

باستعمال طريقتين مختلفتين بين أن F و G دالتان


أصليتان لنفس الدالة.

التمرين 8:


f دالة تآلفية متزايدة تماما على $\mathbb{R}$ و F دالة أصلية لـ f على $\mathbb{R}$. أحد المنحنيات التالية هو للدالة F ما هو؟ برر جابتك.




الشكل (2)



الشكل (1)



الشكل (4)



الشكل (3)

التمرين 9:

f و F دالتان معرفتان على $[1; +\infty[$ بـ

$$f(x) = \frac{-x^2 + 2x + 2}{(1-x)^2} \quad \text{و} \quad F(x) = \frac{ax^2 + bx + c}{1-x}$$

عين الأعداد الحقيقية a ، b و c حتى تكون الدالة F أصلية للدالة f على $[1; +\infty[$ حيث $F(0) = 3$.

التمرين 10:

f دالة معرفة على $[2; +\infty[$ بـ:

$$f(x) = \frac{x^3 - 6x^2 + 12x - 4}{(x-2)^2}$$

1. عين الأعداد الحقيقية a ، b و c حيث من أجل

$$f(x) = ax + b + \frac{c}{(x-2)^2} : x > 2$$


2. استنتج دالة أصلية F للدالة f على $[2; +\infty[$ تحقق $F(3) = -1$.

التمرين 11:

نعتبر الدالة f المعرفة على المجال $[0; +\infty[$ بـ:

$$f(x) = 2x - 1 - \frac{1}{x^2}$$

معلم متعامد $(O; \vec{i}; \vec{j})$ (أنظر الشكل المقابل).



الجزء الأول:

1. باستعمال المنحني (C) ضع تخمينا حول اتجاه تغير

الدالة f على المجال $[0; +\infty[$.

أثبت صحة التخمين.

2. استنتج إشارة $f(x)$ على المجال $[0; +\infty[$.

كيف

يترجم ذلك على التمثيل البياني المقابل؟

3. باستعمال المنحني (C) ضع تخمينا حول نهاية f عند 0.

أثبت صحة التخمين.

4. بين أن المنحني (C) يقبل مستقيما مقاربا مائلا

(Δ) يطلب تعيين معادلة له.

الجزء الثاني

لنكن F الدالة الأصلية للدالة f على المجال

$[0; +\infty[$ بحيث $F(1) = -2$.

1. استنتج من الجزء الأول اتجاه تغير الدالة F

على المجال $[0; +\infty[$.


2. عين عبارة $F(x)$ بدلالة x .

3. أدرس نهايتي الدالة f عند 0 و عند $+\infty$.

4. شكل جدول تغيرات الدالة F .

5. أرسم في معلم متعامد و متجانس (Γ) التمثيل

البياني للدالة F



2. عين دالة أصلية F للدالة f على $\mathbb{R}$

ثم أحسب $F(2) - F(-1)$.

التمرين 15:

نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ $f(x) = 2 - x$.

و ليكن (C_f) تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس


$(O; \vec{i}, \vec{j})$ حيث $\|\vec{i}\| = 1\text{cm}$ و $\|\vec{j}\| = 1\text{cm}$

• أحسب بـ cm^2 المساحة A للحيز

الملون في الشكل المقابل

• عين دالة أصلية F للدالة f على $\mathbb{R}$

ثم أحسب $F(1) - F(-1)$



$$\int_3^4 \frac{x}{(x^2 - 2)^3} dx \quad (16) \quad \int_0^1 x^2 (x^3 + 2) dx \quad (15)$$

التمرين 14:


نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ $f(x) = \frac{3}{2}$.

و ليكن (C_f) تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس

$(O; \vec{i}, \vec{j})$ حيث $\|\vec{i}\| = 1\text{cm}$ و $\|\vec{j}\| = 1\text{cm}$

1. أحسب بـ cm^2 المساحة A للحيز

الملون في الشكل المقابل



2. عين دالة أصلية F للدالة f على $\mathbb{R}$

ثم أحسب $F(2) - F(0)$.

التمرين 3:

نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ $f(x) = x - 1$.

و ليكن (C_f) تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس

$(O; \vec{i}, \vec{j})$ حيث $\|\vec{i}\| = 1\text{cm}$ و $\|\vec{j}\| = 1\text{cm}$

1. أحسب بـ cm^2 المساحة A للحيز

الملون في الشكل المقابل:

التمرين 12:

جد دالة أصلية F للدالة f في كل حالة والتي تحقق

الشرط المعطى:

أ) $f(x) = 2x + 3$ ؛ $F(1) = 0$

ب) $f(x) = 1 - 3x$ ؛ $F(2) = -3$

ج) $f(x) = 0,1x + 100$ ؛ $F(-1) = 0$

د) $f(x) = 3 - 6x^2$ ؛ $F(3) = 15$

هـ) $f(q) = \frac{4}{3}q^3$ ؛ $F(1) = -1$

و) $f(t) = \frac{1}{3}t^3 - 5t^2 + \frac{7}{2}$ ؛ $F(0) = 0$

التمرين 13:

أحسب التكاملات التالية:

1) $\int_0^3 (2x + 3) dx$ 2) $\int_{-2}^1 x^2 dx$

3) $\int_{-5}^5 (4 - x) dx$ 4) $\int_0^2 (1 - x^2) dx$


5) $\int_1^2 (x^2 + x - 2) dx$ 6) $\int_{-1}^0 (-3x^2 + 2x) dx$

7) $\int_{-2}^2 -x^3 dx$ 8) $\int_1^3 (x^3 + 2x + 2) dx$


9) $\int_1^2 \left(\frac{x^2 - 2}{x^2} \right) dx$ 10) $\int_{-2}^{-1} \left(\frac{1 - t^3 + t^4}{t^2} \right) dt$

11) $\int_0^1 \frac{1}{(x+1)^3} dx$ 12) $\int_0^1 \frac{-2}{(x-2)^3} dx$

13) $\int_0^1 (x-1)^4 dx$ 14) $\int_1^2 2x(x^2 - 1) dt$



الشكل (2)



الشكل (1)

التمرين 20:


f دالة معرفة على $[-1;1]$ بـ :

$$f(x) = \begin{cases} -2x & ; x \in [-1;0] \\ x^2 & ; x \in [0;1] \end{cases}$$

1. أنشئ المنحني c الممثل للدالة f .
2. هل الدالة f مستمرة على $[-1;1]$.
3. احسب مساحة الحيز تحت المنحني c .

التمرين 21:

f هي الدالة المعرفة بتمثيلها البياني في الشكل المقابل.



من أجل $f(x) = x^3, x \in [0;1]$


من أجل $f(x) = x+1, x \in [1;3]$

1. احسب $\int_1^3 f(x) dx$ ثم $\int_0^1 f(x) dx$

2. استنتج $\int_0^3 f(x) dx$

التمرين 18:

التمثيل البياني التالي هو لدالة f معرفة على $[-2;2]$ في معلم متعامد ومتجانس.



أحسب التكاملات التالية:

$$(1) \int_{-2}^{-1} f(x) dx \quad (2) \int_{-1}^1 f(x) dx$$

$$(3) \int_1^2 f(x) dx \quad (4) \int_{-2}^2 f(x) dx$$

التمرين 19:

في كل شكل من الشكلين التاليين ، c هو المنحني الممثل لدالة f . احسب تكامل f على مجموعة تعريفها مستعملا المساحة .


التمرين 16:

(C) هو المنحني البياني الممثل لدالة f في معلم

متعامد $(O; \vec{i}, \vec{j})$ حيث $\|\vec{i}\| = 1cm$ و $\|\vec{j}\| = 1cm$

الممثل لدالة f معرفة على $[0;5]$ حيث :


$$f(x) = \begin{cases} (x-1)^2 & ; 0 \leq x \leq 2 \\ f(x) = \frac{1}{(x-1)^2} & ; 2 \leq x \leq 5 \end{cases}$$



احسب المساحة تحت المنحني (C) بين 0 و 5 مقدرة بـ cm^2 .

التمرين 17:

التمثيل البياني لتالي هو لدالة f معرفة مستمرة على $[0;3]$ كما يلي:



$$1. \text{ احسب } \int_0^2 f(x) dx , \int_{-1}^2 f(x) dx , \int_{-1}^3 f(x) dx$$

2. احسب القيمة المتوسطة للدالة f على المجال $[0; 2]$.

التمرين 22:

لتكن الدالة العددية f للمتغير الحقيقي x حيث:

$$f(x) = \frac{2x^3 + 3x^2 + 4}{x^2}$$

نرمز بـ (C) إلى التمثيل البياني للدالة f في المستوى

المنسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$

1. عين الأعداد الحقيقية a ، b و c بحيث من أجل

$$\text{كل عدد حقيقي غير معدوم } x : f(x) = ax + b + \frac{c}{x^2}$$

2. احسب المساحة $S(\lambda)$ للحيز المحدد بالمنحني (C)

و محور الفواصل و المستقيمين اللذين معادلتهما:

1. $x = \lambda$ و $x = 1$ حيث λ عدد حقيقي أكبر تماماً من 1.

التمرين 23:

نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R} - \{-1\}$ بـ:

$$f(x) = \frac{-x^3 - 2x^2 - x - 4}{(x+1)^2}$$

1. عين الأعداد الحقيقية a ، b و c بحيث من

أجل كل عدد حقيقي x يختلف عن -1:

$$f(x) = ax + \frac{b}{(x+1)^2}$$

2. أ- احسب نهايات الدالة f عند حدود مجموعة

التعريف

ب- بين أنه من أجل كل x من $\mathbb{R} - \{-1\}$:

$$f'(x) = \frac{-(x-1)(x^2 + 4x + 7)}{(x+1)^3}$$

ج- ادرس إشارة $f'(x)$ و شكل جدول تغيرات f

3. بين أن المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حلاً واحداً α

حيث $-2 < \alpha < -2,5$

4. بين أن المستقيم D الذي معادلته $y = -x$

مقارب للمنحني (C) عند $-\infty$ و عند $+\infty$.

5. أرسم D و المنحني (C) الممثل للدالة f في

معلم متعامد $(O; \vec{i}, \vec{j})$ ، الوحدة: 2cm على محور

الفواصل و 1cm على محور الترتيب.

6. أ- احسب ، بوحدة المساحات ، المساحة

$S(\alpha)$ لحيز المستوي المحدد بالمنحني (C) ،

المستقيم D اللذين معادلتهما $x = -2$ و $x = \alpha$.

ب- تحقق من النقطتين $A(-3; 2)$ و $B(-2; -2)$

تنتميان إلى المنحني (C) .

ج- احسب بـ cm^2 المساحة S لحيز المستوي

المحدد بالمنحني (C) و القطعة $[AB]$.

انتهى

من اعداد
الأستاذ:
شعبان
أسامة